



ชุมทางสารTungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๔๖/๖๒

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

จากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวนกว่า ๑.๑๘๖ ราย มีรายงานผู้ป่วยในทุกอำเภอ คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช รongลงมา อ.นาบอน ท่าศาลา ปากพั่น ถ้าพรธรรมา และ อ.พิปูน ตามลำดับ จากรายงานดังกล่าวสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้มีแนวโน้มที่สูงและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน รวมทั้งผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดทำแผนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในแต่ละชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	ชุมชน
๑๗ มิ.ย. ๖๒	ยุทธศาสตร์
๑๘ มิ.ย. ๖๒	ประจักษ์
๑๙ มิ.ย. ๖๒	ตลาดสด และศาลเจ้าพ่อเสือ
๒๐ มิ.ย. ๖๒	ทุ่งสง - ห้วยยอด
๒๑ มิ.ย. ๖๒	หมู่บ้านพัฒนา และมูลนิธิข้าปกอง
๑ ก.ค. ๖๒	เขาปรีดี และศาลเจ้าโป๊ยเซียน
๒ ก.ค. ๖๒	เสริมชาติ บ้านนาเหนือ
๓ ก.ค. ๖๒	บ้านพักรถไฟ ทุ่งสง - นาบอนและวัดโคกสะท้อน ตลาดใน สะพานเหล็ก
๔ ก.ค. ๖๒	เปรมประชา ราชบริพัตร หลังโรงพยาบาลทุ่งสง และวัดชัยชุมพล ตะวันออกวัดชัยชุมพล
๕ ก.ค. ๖๒	บ้านในหวัง สำนักสงฆ์ถ้ำทอทุก สวนพฤกษาสีรินทร ท่าแพใต้ และวัดท่าแพ ท่าแพเหนือ โคมทองธานี

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือนของท่าน นำเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน ปิดฝาภาชนะอาหารต่างๆ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค คือ การเก็บ บ้านให้สะอาด เก็บขยะโดยรอบบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ โดยสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุง คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย อีกทั้งขอความร่วมมือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน คลินิก ร้านขายยา ในการระมัดระวังการจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก คือ ยาแอสไพริน และยาที่ลงท้าย ด้วย-เฟน เพราะจะทำให้มีอาการป่วยที่รุนแรงขึ้น ซึ่งโรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษา ตามอาการ คือ ให้ยาลดไข้ เช็ดตัว ป้องกันอาการช็อก อาการของโรค ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง หรือเจ็บที่ชายโครง ด้านขวา มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากไข้หวัดที่จะมีน้ำมูกร่วมด้วย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรง คือ ผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ห้ามซื้อยามา รับประทานเอง ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒