



ชุมทางสารTungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๓๗/๖๔

เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน

ด้วยในขณะนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนตกชุกหนาแน่น ทำให้เกิดแอ่งน้ำขังหรือมีน้ำท่วมขังตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ จานรองกระถางต้นไม้ และกาบใบไม้ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย สาเหตุของการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน

อาการของโรคไข้เลือดออก หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกกัดประมาณ ๕-๘ วัน จะทำให้เกิดอาการของโรค คือ เริ่มจากมีไข้สูงลอยประมาณ ๒-๗ วัน ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก เหมือนไข้หวัด นอกจากนี้อาจมีผื่นหรือจุดแดงๆ ขึ้นที่ใต้ผิวหนัง หลังจากนั้นไข้จะลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะฟื้น ตัว สดชื่น และหายเป็นปกติ แต่หากไข้ลดแล้ว มีอาการซึม เบื่ออาหาร มีอาการเพลียมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะจะเกิดอาการช็อคได้ ส่วนในกลุ่มเด็กเล็กให้ผู้ปกครองดูแลเป็นพิเศษ เพราะเด็กยังไม่สามารถบอกอาการตัวเองได้ ผู้ปกครองควรใช้วิธีสังเกตอาการ ของเด็กอย่างใกล้ชิด ให้ทานยาพาราเซตามอลลดไข้ ห้ามเช็ดตัว หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพาพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกวิธี

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงทุกท่าน ได้รับทราบ พร้อมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค คือ การเก็บบ้านให้สะอาด เก็บขยะ โดยรอบบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ป้องกันยุงลาย ลงไปวางไข่ ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง